

Referências: 1. Auditoria PMB/IMS 2015 2. Modelo de Propaganda Médica EMS 3. Organização Mundial de Saúde 4. Revista de Preços ABCFarma Janeiro 2016

Dalyne® (drospirenona + etinilestradiol). Apresentação: Embalagem com 21 comprimidos revestidos contendo 3mg de Drospirenona + 0,030mg de Etinilestradiol. Uso oral. Uso adulto. Indicações - Dalyne® é indicado para prevenir a gravidez com benefícios adicionais tais como a melhoria dos sintomas associados à retenção hídrica do período pré-menstrual, da acne e redução do excesso de oleosidade da pele e do couro cabeludo. Contraindicações – Antecedentes ou presença de Doença Cardiovascular especialmente o Tromboembolismo venoso, AVC (hemorrágico ou isquêmico) suspeita clínica de Angina Pectoris, de Infarto do Miocárdio, Enxaqueca acompanhada de “aura”, Câncer genital ou das mamas hormônio-dependente. Também é contraindicado nos casos de Diabetes mellitus, história atual ou anterior de Pancreatite, Hipertrigliceridemia, Hepatopatias, Insuficiência renal aguda, Sangramento vaginal de causa desconhecida, suspeita ou na gestação, amamentação e hipersensibilidade a qualquer um dos componentes deste medicamento. Precauções e Advertências - O risco de ocorrência de tromboembolismo venoso está aumentado entre as usuárias de contraceptivos orais (CO), principalmente aqueles contendo progestagênio de 3ª geração (gestodeno, desogestrel e drospirenona). Este risco também está aumentado entre as usuárias de CO que são fumantes e especialmente as fumantes com mais de 35 anos. Na presença de sinais de trombose, deve-se suspender o CO e consultar imediatamente o médico. Pode ocorrer aumento da pressão arterial enquanto estiver utilizando contraceptivo. O risco de trombose venosa profunda está aumentado na usuária de CO, temporariamente, no caso de cirurgia ou durante imobilização prolongada. Determine a suspensão do Dalyne® na presença das contraindicações assinaladas. Eficácia - Quando usados corretamente, o índice de falha é de menos de 1% ao ano. Interações Medicamentosas - Drogas para tratamento da epilepsia (primidona, fenitoína, barbitúricos, carbamazepina), Tuberculostáticos (rifampicina e rifabutina), alguns antibióticos (penicilinas e tetraciclina), medicamento para tratamento da AIDS, ritonavir, o antibiótico antimicótico griseofulvina e com medicamentos que contenham Erva de São João, usada principalmente para o tratamento de estados depressivos. Alguns medicamentos como cetoconazol, eritromicina, ciclosporina podem inibir o metabolismo de Dalyne®. É possível que ocorra, também, interação com oxcarbazepina, topiramato, felbamato. Reações Adversas – náuseas, dores abdominais, dor de cabeça, estados depressivos, alterações de humor, dor, hipersensibilidade e dolorimento das mamas e trombose. Posologia - iniciar o Dalyne® no primeiro dia da menstruação. A seguir, tomar os 20 comprimidos restantes, consecutivamente, de preferência no mesmo horário. Praticar pausa de 7 dias. Nesse período, cerca de 2 a 3 dias após a ingestão do último comprimido, deverá ocorrer a menstruação. Iniciar nova cartela no oitavo dia, independentemente de ter parado ou não o sangramento menstrual. Comprimidos esquecidos: se houver transcorrido menos de 12 horas da tomada, deve ser ingerido imediatamente e continuar os comprimidos restantes da cartela, no horário habitual. A proteção do Dalyne® será mantida. Se houver transcorrido mais de 12 horas, deve-se tomar imediatamente o comprimido esquecido, mesmo que isso signifique a ingestão simultânea de dois comprimidos. O efeito contraceptivo pode estar reduzido especialmente se o esquecimento ocorrer no início ou no final da cartela. Nessa situação proceder da seguinte maneira: 1. se esquecer de tomar um comprimido na semana inicial, tome o comprimido esquecido assim que lembrar e continue a tomar os próximos no horário habitual. Utilize um método contraceptivo adicional durante os próximos 7 dias; 2. se esquecer de tomar um comprimido na segunda semana de uso, tome o comprimido esquecido e continue a tomar os próximos no horário habitual. A proteção contraceptiva de Dalyne® está

mantida. Não é necessário utilizar método contraceptivo adicional; 3. se esquecer de tomar um comprimido na terceira semana, escolha uma das seguintes opções, sem a necessidade de utilizar método contraceptivo adicional: deve-se tomar imediatamente o comprimido esquecido e continuar os restantes da cartela, no horário habitual a) tome o comprimido esquecido assim que lembrar e continue a tomar os próximos no horário habitual. Terminada a cartela, inicie a nova, sem que haja intervalo entre elas. É possível que o sangramento menstrual aconteça somente após o término da segunda cartela. No entanto, pode ocorrer “spottings”, sangramento de escape durante o uso da nova cartela, b) Deixe de tomar os comprimidos restantes, faça uma pausa de sete dias, contando inclusive o dia no qual esqueceu de tomar o comprimido e inicie uma nova cartela. Venda sob Prescrição Médica. Registro MS nº 1.3569.0642. Detentora EMS SIGMA PHARMA LTDA. Fabricado por EMS S/A – São Bernardo do Campo/SP.